

**coa**

Soluciones®  
Odontológicas  
Integrales

Manejando  
**el dolor en**  
tu práctica





# MÁS ALLÁ de la INYECCIÓN

*Confianza, satisfacción,  
reputación y eficiencia*



# Articaína

# Medicaine

Clínicamente superior y más segura

**Anestésico local inyectable a base de Articaína al 4% con Epinefrina 1/100.000 y 1/200.000**

**· Medicaine 1/200.000**

Con baja concentración de Epinefrina (0.009mg) Anestésico de uso general ideal para procedimientos de operatoria dental, odontopediatría o en los casos de pacientes en donde el uso de epinefrina debe ser limitado, mas no contraindicado.

**· Medicaine 1/100.000**

Con concentración de Epinefrina (0.018mg). Anestésico de uso general. Procedimientos de endodoncia, cirugía periodontal y maxilofacial.



**Características Medicaine 4%**

Concentración	pH	Tiempo de latencia	Duración	Vida plasmática media
Medicaine 1:100,000	4.0 a 5.5	1-3 min <sup>(1)</sup>	Pulpar: 60-75 min Tejido: 180-360 min	20-30 min <sup>(2,3,4)</sup>
Medicaine 1:200,000	4.0 a 5.5	1-3 min <sup>(1)</sup>	Pulpar: 45-60 min Tejido: 120-300 min	20-30 min <sup>(2,3,4)</sup>

(1) Malamed's Handbook of local anesthesia. 5th Edition. Mosby  
 (2) Borchard U, Drouin H; Articaine: action of local anesthetics on myelinated nerve fibers Eur J Pharm 1980;62(1):73-9  
 (3) Ortel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokin. 1997;33(6):417-25  
 (4) Becker D. Drug therapy in dentistry. 2<sup>nd</sup> Ed. Hayden-McNeil 1996 1.6-1.8.

# Mepivacaína

# Scandonest



**Anestésico local inyectable a base de mepivacaína al 2% y 3% sin Vasoconstrictor.**

**Características y Beneficios**

- Con o sin vasoconstrictor de acuerdo a las necesidades del procedimiento y condiciones médicas del paciente.
- Las fórmulas preferidas a nivel mundial por el gusto del odontólogo.

**Fórmula sin vaso constrictor disponible para utilizarse en pacientes de riesgo.**

**Características Scandonest/Mepivacaína**

Concentración	pH	Tiempo de latencia	Duración	Vida plasmática media
Mepivacaína 2% con vasoconstrictor	3.5 a 5.0	2 a 3 min	Pulpar: 60 min Tejido: 120-300 min	Aproximadamente 115 mins
Mepivacaína 3%	6.4 a 6.8	2 a 3 min	Pulpar: 20-40 min Tejido: 120-180 min	Aproximadamente 115 mins

✓ 5 AÑOS GARANTÍA

# Jeringa Septodont

· Hecha en una sola pieza


Esteriliza la jeringa sin desarmarla. Evita perder piezas y previene que se haga juego entre las piezas.



· Ergonómica

Con un diseño atractivo que se adapta perfectamente a tu mano y que además está creada en acero inoxidable ligero para una infiltración más cómoda.

· Anillos de agarre en 3 tamaños:



· Disponibles en dos sistemas:



Aspirante



Autoaspirante



# AGUJAS Septoject

La aguja universal para cualquier procedimiento de anestesia

## Características y beneficios

- Excelente penetración en el tejido que se logra con un bisel triple de alta calidad y una cánula pulida y siliconizada.
- Tubo de acero inoxidable de alto grado para reducir el riesgo de rotura.
- Indicador de bisel para asegurar una buena orientación de inserción.



Otras marcas



Septoject



(1) Evaluation microscopique des aiguilles dentaires. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Fernandez. University Center Le Chirurgien Dentiste de France No. 1206, du 07 avril 2005

(2) Assessing dental needles. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Fernandez. University Center of Health Sciences, Guad

# AGUJAS Septoject XL

Un mayor diámetro interior para minimizar el dolor y mejorar el control

## Características y beneficios

- Un mayor diámetro interior requiere de un menor esfuerzo para inyectar aún en tejidos densos.
- Mayor flexibilidad, debido a paredes más delgadas
- Aspiración mejorada.
- Misma penetración al tejido que una aguja Septoject tradicional (triple bisel y cánula siliconizada)



## Comparativa de diámetros

Septoject XL    Aguja Estándar





### **Guadalajara**

Lerdo de tejada No. 2473  
Col. Arcos Sur, C.P. 44150  
Guadalajara, Jal. México.  
Tel: (33) 5000 9999  
Fax: (33) 5000 9960  
800 2481 COA

### **Ciudad de México**

Odontología No. 82  
Col. Copilco Universidad,  
C.P. 04360, CDMX  
Tel: (55) 5000 9999  
Fax: (55) 5000 9972  
800 0622 COA

### **CENTRO DE ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS**

800 262 5000

### **Monterrey, NL**

Venado No. 600, Col.  
Mitras Centro C.P.  
64460, Monterrey, NL  
Tel: (81) 4444 3020

### **Chile**

Las Encinas 3296  
Ñuñoa, Santiago, Chile  
Fono: (562) 7905200

